

# Dyrlægen skriver

Af fagdyrlæge Finn Boserup



## Husk at

- pelspleje af langhårede hunde og katte er meget vigtig efter sommerens mange timer i naturen.
- lade være med begynde at løbetræne med din hund, før den er over 1 år gammel - og så langsom optræning.
- rømmen og grynten hos en hund kan være tegn på hjerte-lungeorm. Er du i tvivl, så få undersøgt en afføringsprøve hos din dyrlæge.
- nogle hunde, også racehunde, der importeres fra Østeuropa, er opdrættet nærmest på "hundefabrikker" under dårlige kår, så vær meget opmærksom, hvis du føler dig fristet til at købe en hund, hvis forældre - eller i hvert fald mor - du ikke kan få at se.
- fodring af rævene i naturen ikke er til gavn for rævene - snarere tværtimod.
- hvis du har givet kattekillingen ved sommerhuset mad i løbet af sommeren, så har du et ansvar for dens videre liv.
- et vejrmæssigt lunt efterår giver gode forhold for lopper.
- man ikke kan overlade ansvaret for et dyr til børn - der skal altid være et voksent menneske, som har det endelige ansvar.
- man kan tegne sygeforsikring både for hunde og for katte. Det luner, hvis ens dyr bliver alvorligt sygt.

## Hjerte-lungeorm igen

*Hjerte-lungeorm er en meget alvorlig sygdom. Man kan heldigvis let få hunden undersøgt, hvis man er bange for, at den er smittet.*

Nu hvor sommeren er gået på hæld, ændrer naturens fauna sig også.

F.eks. bliver antallet af snegle mindre og mindre - og derved også risikoen for, at vore hunde kan blive smittet med den franske hjerte-lungeorm eller med rævens lungeorm.

### Hvordan bliver hunden smittet?

For at hunden kan blive smittet med disse parasitter, kræves det, at den er i nærkontakt med en snegl. Arten af snegl er ligegyldig, idet alle typer kan være smittebærende. Med nærkontakt menes, at hunden enten direkte spiser sneglen eller slikker på det slimspor, som sneglene sætter efter sig, når de kryber hen over overfladen på jorden, på græsset eller på blade.

I dette slim kan parasitten sidde, og når hunden er kommet til at fortære dette larvestadium, udvikler larven sig videre i hunden til de voksne orm, der opholder sig i lunger og i hjertet.

### Hvordan viser sygdommen sig?

Symptomerne er meget forskellige fra hosten, grynten og rømmen - lidt lige som tobakshoste - til alvorlige problemer med blødninger

og nedsat evne til, at blodet kan koagulere - kan størkne, så blødningerne standser.

Men der er også tilfælde, hvor symptomerne er vanskelige at få øje på. Der kan blot være tale om lidt nedsat aktivitet - lidt uoplagthed, som er meget vanskeligt at iagttage.

### Forebyggende undersøgelse og behandling

Men nu, hvor sneglene langsomt forsvinder fra naturen for denne sæson, kan hundene altså ikke blive smittet mere, så derfor kan det være en god ide i de områder af landet, hvor disse parasitter huser, at få undersøgt, om ens hund skulle gå med en infektion, hvis symptomer man ikke har opdaget endnu.

Dette foregår ved, at man opsamlers afføring fra hunden i 3 på hinanden følgende dage.

Denne afføring afleveres til dyrlægen, der undersøger, om der er larver i afføringen.

Hvis svaret er positivt, er det jo godt at behandle og komme af med parasitten, før hunden bliver syg, og hvis svaret er negativt, kan man regne med, at det næste halve år, indtil sneglene atter kommer frem, er der ikke nogen reel risiko for, at hunden kan blive smittet.

# Når hundens negle knækker

*Det sker undertiden, at hunde kommer til skade med deres kløer. Den slags små uheld må man ikke ignorere.*

”Min hund har brækket en negl, men det bløder ikke mere, så er det vel ikke nødvendigt at komme?” - Ja, sådan lyder spørgsmålet ret tit i dyrlægens telefon.

Om det er nødvendigt at komme eller ej, kan ofte være svært umiddelbart at afgøre, men der er et par ting, som man som hundeejer i denne situation skal have in mente.

## En brækket negl skal muligvis fjernes

Hvis neglen er brækket, men stadig sidder på tåen, så generer det hunden, hver gang den går, og så skal denne negl formentlig fjernes.

Hvis den sidder meget løst, er det en let sag, men hvis den sidder mere fast, må man give hunden en beroligende og smertestillende in-

jektion eller bedøve den helt, før man på forsvarlig måde kan fjerne resten af en sådan løstsiddende negl.

## Faren for infektioner

Og så er der et andet forhold, nemlig, at der altid i disse tilfælde kan være en risiko for, at der kommer infektion.

Afstanden ind til klobenet, altså den yderste tåknogle, er meget lille. Derfor vil også mindre infektioner nogle gange ligge og ulme, og hvis først der er gået infektion i benhinden og i selve knoglen, er det meget svært at standse infektionen med antibiotika.

Det sker hvert år mange gange, at en hund må have amputeret det yderste stykke af en tå, fordi der er

gået betændelse i selve knoglen.

Selv om hundene klarer sig fint med en amputeret tå, så er det nu også her bedre at undgå operationen.

Derfor skal man som hundeejer vide, at hvis sådan en tå, hvor neglen er brækket af, bliver ved med at være øm, eller vævet omkring tåen begynder at hæve, så er der en stor risiko for, at der er infektion, og så skal hunden i professionel behandling.

## Søg dyrlæge, hvis der er tvivl

Derfor er det tit vanskeligt i telefonen at råde til, om man skal komme til en konsultation eller ej. Men er der tvivl, er pengene til en konsultation ofte givet godt ud, hvis man på den måde kan undgå en senere tå-amputation - for slet ikke at tale om det vigtigste: at det også er langt rarere for hunden ikke at skulle have ondt i tåen i et stykke tid og så senere gennemgå en operation.