


Spørg dyrlægen

Redigeret af fagdyrlæge Finn Boserup



Problemer med analkirtlerne

? Ole Sørensen i Rødovre har en 8 år gammel Schæferhund, en hanhund, der omkring endetarmsåbningen får nogle sår, der dels generer hunden med kløe og dels også generer Ole Sørensen, fordi det somme tider bløder, når hunden klør rumpen. Ole Sørensen har selv tømt analkirtlerne, men det ændrede ikke på sagen. Hvad kan det så være?

! Netop hos Schæferracen ser man en gang imellem en immun sygdom, der giver sår og revner netop i området omkring endetarmsåbningen - de såkaldte analfistler.

Det første, som du skal gøre, er at få din dyrlæge til at konstatere, hvad din hund fejler.

Hvis der er tale om disse lidt ubehagelige analfistler, findes der i dag et middel, der hedder Ciclosporin, som hjælper i mange tilfælde. Desværre er behandlingsprisen ret høj, men alternativet er operation, som er ret kompliceret, og som kan medføre vanskeligheder for hunden med senere at kontrollere sin afføring.

Men et er sikkert, din hund vil gerne have tid hos sin dyrlæge.

Når det klør i hundens ører

? Benedikte Lund i Kolding har en 5 år gammel hunhund med kløe i ørerne. Hunden er blevet behandlet mange gange med øredråber, og det hjælper lidt, men problemet ser ikke ud til at forsvinde. Er der sådan nogle uheldelige ørebetændelser?

! I en sådan sag er det vigtigt at forsøge at finde årsagen til ørebetændelsen. Meget ofte behandler man jo en hund med ørebetændelse uden helt at vide, om det er svampe, bakterier eller noget helt andet, der er årsagen. Og i langt de fleste tilfælde hjælper behandlingen.

Men i et sådant tilfælde må man gå lidt dybere i efterforskningen af en årsag.

Det kunne være noget med at dyrke mikroorganismer for at få at vide, om der er nogle sygdomsfremkaldende mikroorganismer til stede.

En anden årsag kunne være allergi, og det forekommer nok hyppigere og hyppigere.

Så også din hund vil gerne have tid til en undersøgelse hos dyrlægen.

"Australsk tæppetisser"

? En lille Australsk Terrier, en herre på 11 måneder, har den uvane at lette ben, hver gang den kommer et nyt sted. Hjemme gør han det aldrig. Hvad kan man gøre ved det? spørger Lone Nielsen i Assens.

! Mange Terriere - og også den australske - er meget selvbevidste og lidt dominerende hunde, der absolut selv vil bestemme.

Og din hund er jo et "pubertetsbarn" lige i øjeblikket, og når han kommer ud i nye omgivelser, så mener han selvfølgelig, at han skal markere, at her har han været, og her bestemmer han.

Det er selvfølgelig meget generende, og formentligt er det et pubertetsproblem. Lidt kan det hjæl-

pe at skælde ham ud, når han gør det, men det skal være lige nu og her, når det sker. Ellers vil jeg anbefale dig at tale med en dyrepyskolog. Jeg tror bestemt ikke, at det er et udtryk for fysisk sygdom.

Om fagdyrlæger

? Else Knudsen i Ålborg spørger, hvad forskellen på en dyrlæge og en fagdyrlæge er.

! Ja, det falder måske lidt uden for det, som vi plejer at beskaefte os med her, men alligevel.

Forskellen på en dyrlæge og en fagdyrlæge er, at fagdyrlægen har gennemgået en 2-årig ekstra uddannelse inden for sygdomme hos hunde og katte - eller inden for sygdomme hos kvæg eller hos grise. Så fagdyrlægen er en dyrlæge med en overbygning på sin uddannelse inden for en dyregruppe.

Hvor hurtigt kan katten få killinger igen?

? En af vores trofaste læsere i Nærum spørger, om en kat virkelig kan blive med killinger igen lige efter at have født et kuld?

Hun har nemlig en kat, der har 7 uger gamle killinger, og nu ser det ud til, at moderen er ved at blive tykmavet igen.

! Ja, katten kan på trods af, at hun ammer sine killinger, have ægløsning så tidligt som ca. 9 dage efter fødslen, og bliver hun parret ved den lejlighed, ja, så føder hun jo omkring 70 dage efter, at hun fødte sit sidste kuld.

Det kan derfor være en klog foranstaltning at give katten p-piller

umiddelbart efter fødslen for at undgå en sådan situation. P-piller på dette tidspunkt kan bevirke en nedsat mælkemængde, men det er sjældent noget problem for killingerne, men godt for moderkatten.

Kat blev blind efter en lungebetændelse

? *Henning Petersen* har en kat på 5 år, der efter en behandling for en lungebetændelse er blevet blind og nu har helt store pupiller, både dag og nat.

Hans dyrlæge siger, at katten har været særlig følsom over for medicinen, og at man ikke kan gøre noget ved det. Er det rigtigt?

! Det kan desværre godt være rigtigt. Der findes et særdeles godt og virksomt antibiotisk middel, der hedder Enrofloxacin, der ved blot en meget lille overdosering til katte kan give skader i nethinden, hvor de synsopfattende celler - stavene og tappene - ødelægges, og det medfører stort set altid total blindhed.

Så hvis det er det middel, som din kat er blevet behandlet med, kan det desværre godt være korrekt, at katten er blevet blind af behandlingen. Og desværre også rig-

tigt, at man ikke kan gøre noget ved det.

Broholmer, der halter

? *Henning i Nordsjælland* har en Broholmer på 7 år, der bliver ved med at halte på højre forben. Han har været til dyrlæge og fået noget smertestillende gigtmicin, men det har desværre ikke hjulpet en brik. Og hundens ben er stadig hævet lige over det nederste led.

Hvad kan der gøres?

! OK, hvis hævelsen sidder over leddet og ikke i eller omkring leddet, så er der nok ikke tale om en klassisk gigtsygdom.

Med den alder og størrelse, som din hund har, kunne der være tale om knoglekræft, men til alt held også om betændelse i benhinden.

Jeg synes, at den eneste vej videre er at få taget nogle røntgenbilleder af benet. Det vil med meget stor sandsynlighed afsløre, hvad der er tale om. Og herefter kan man jo så tage stilling til en egentlig målrettet behandling.

Meget tyder jo på, at din hund har ondt i benet, og det er jo hverken rart eller rimeligt.

Rabiesvaccination til Sverige og Norge

? *Rigmor Petersen i Frederikshavn* skriver: Jeg har en dejlig Golden Retriever, Basco, en han på 4 år, som jævnligt kommer med til Sverige. Nu har jeg lige fået den vaccineret, og nu siger dyrlægen, at den kun behøver at få rabiesvaccine - altså vaccine mod hundegalskab - hvert 3. år.

Risikerer jeg så ikke, at Basco ikke mere kan komme ind i Sverige?

! For et par år siden blev kravet om rabiesvaccination for hunde, der rejser ind i Sverige og Norge ændret, således at hunde, der er vaccineret, efter de er fyldt 12 måneder, kun kræves genvaccineret hvert 3. år.

Men husk, at hunde, der er vaccineret, inden de er fyldt 12 måneder, skal genvaccineres senest 12 måneder efter første vaccination.

Men for Bascos vedkommende er det helt korrekt, hvad din dyrlæge har fortalt dig.

På Fødevarerstyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk kan du læse om reglerne.